



ANEURISMA CEREBRAL DE LA BIFURCACIÓN  
DE ACM IZQUIERDA TRATADO CON  
NEUROFORM ATLAS Y STENTING Y COILS 360º


## ANEURISMA CEREBRAL DE LA BIFURCACIÓN DE ACM IZQUIERDA TRATADO CON NEUROFORM ATLAS Y STENTING Y COILS 360º

Paciente de 58 años de edad que en el contexto de C de vulva diseminado, comienza con cefalea, realizándose RM que muestra imagen de aneurisma de ACM derecha




Estudio 3D TOF que muestra aneurisma de ACM derecha

ANEURISMA CEREBRAL DE LA BIFURCACIÓN DE ACM IZQUIERDA TRATADO CON  
NEUROFORM ATLAS Y STENTING Y COILS 360º





ANGIOGRAFIA 3D QUE MUESTRA ANEURISMA DE CUELLO ANCHO POLILOBULADO DE LA BIFURCACION DE ACM  
DERECHA

## ANEURISMA CEREBRAL DE LA BIFURCACIÓN DE ACM IZQUIERDA TRATADO CON NEUROFORM ATLAS Y STENTING Y COILS 360º




Se planifica en 3D la colocación de stents Neuroform Atlas en Y Configuración Se eligen (imágenes laterales), las proyecciones de trabajo

## ANEURISMA CEREBRAL DE LA BIFURCACIÓN DE ACM IZQUIERDA TRATADO CON NEUROFORM ATLAS Y STENTING Y COILS 360º




Colocación del primer Neuroform atlas de 3x24 mm en la división superior de ACM hasta M1, así como colocación de SL 10 intraneurismático. El catéter intermedio es un VECTA de 115 cm, introducido a través de Infiniti PLUS Long Sheath

ANEURISMA CEREBRAL DE LA BIFURCACIÓN DE ACM IZQUIERDA TRATADO CON  
NEUROFORM ATLAS Y STENTING Y COILS 360º



PROYECCION AP




Colocación del segundo stent Neuroform Atlas de 4x24mm en la división inferior de  
ACM hasta M1, adoptando ambos configuración en Y

ANEURISMA CEREBRAL DE LA BIFURCACIÓN DE ACM IZQUIERDA  
TRATADO CON NEUROFORM ATLAS Y STENTING Y COILS 360º






PROYECCION LATERAL




Colocación del segundo stent Neuroform Atlas de 4x24mm en la división inferior de ACM hasta M1, adoptando ambos configuración en Y

ANEURISMA CEREBRAL DE LA BIFURCACIÓN DE ACM IZQUIERDA  
TRATADO CON NEUROFORM ATLAS Y STENTING Y COILS 360°

COLOCACION DE COILS  
INTRANEURISMATICOS



ANEURISMA CEREBRAL DE LA BIFURCACIÓN DE ACM IZQUIERDA  
TRATADO CON NEUROFORM ATLAS Y STENTING Y COILS 360°



ANGIOGRAFIA FINAL QUE MUESTRA CIERRE COMPLETO DEL ANEURISMA

## ANEURISMA CEREBRAL DE LA BIFURCACIÓN DE ACM IZQUIERDA TRATADO CON NEUROFORM ATLAS Y STENTING Y COILS 360º

### CONCLUSIONES:

- La técnica de “stenting” con configuración en Y con stent Neuroform Atlas es sencilla de realizar y con gran reproducibilidad en su desarrollo
- Conseguimos con dicha técnica una alta tasa de oclusión aneurismática con una baja tasa de complicaciones perioperatorias, especialmente en lo que se refiere a la trombosis intrastent que es extraordinariamente rara
- La utilización de toda la familia de productor de Stryker para esta técnica (INFINITI PLUS , Catéter intermedio Vecta 115 cms y coils 360 de Stryker), suponen un perfecto método e ideal para la realización de esta técnica