






Aneurisma de arteria carótida interna del segmento supraclinoideo.

- Mujer
- 47 años.
- Cefaleas de larga evolución.
- Tc Craneal-Angio Tc.
- Hallazgo de aneurisma incidental en arteria carótida interna derecha.




Aneurisma de arteria carótida interna del segmento supraclinoideo

- Arteriografía cerebral con reconstrucción 3D.
- Aneurisma sacular ,único ,de 22 mm de diámetro máximo y un defecto de pared en proyección del cuello de 4 mm.





Aneurisma de arteria carótida interna del segmento supraclinoideo

- Arteriografía cerebral pretratamiento:
- Aneurisma sacular de 22 mm de diámetro máximo y un defecto de pared en proyección del cuello de 4 mm.



Aneurisma de arteria carótida interna del segmento supraclinoideo

- Arteriografía cerebral post tratamiento:
- Se coloca stent flow diverter Surpass de 4 mm x 20 mm, a nivel del segmento C4-C7 de la Aci derecha, objetivándose una modificación en el flujo de entrada-salida del aneurisma. Signo del eclipse (retención de contraste intraaneurismático)



Aneurisma de
arteria carótida
interna del
segmento
supraclinoideo

Arteriografía de
control, 30 minutos
post colocación de
stent donde se
visualiza trombosis
del saco
aneurismático.

