

**ICP CON IMPLANTE DIRECTO DE STENT
FARMAOACTIVO ORSIRO EN ESTENOSIS DE DA
PROXIMAL SUBTOTAL PREVIA A BIFURCACION
CON RAMA DIAGONAL**

Dra. Olga Sanz


Historia clínica

- Varón de 55 años de edad sin cardiopatía conocida
- DM de reciente diagnóstico
- Ingreso por angina de reciente comienzo con carácter progresivo
- ECG sin alteraciones. No elevación de marcadores cardiacos. FVI conservada

Coronariografía


- Se realiza coronariografía en las primeras 48 horas que objetiva enfermedad coronaria multivaso, con afectación DA proximal y lesión severa en la CD a nivel de la cruz con buenos lechos distales.

Angioplastia coronaria:



- Lesión Da proximal subtotal previa a bifurcación con rama diagonal.
- Se realiza ICP con implante directo de stent farmacoactivo Orsiro 3.0/26 mm con éxito


ACTP en 2º tiempo



- A continuación se aborda lesión crítica en cruz de CD con paso de guías Galeno a IVP y TPL.
- Se realiza predilatación con balón Pantera 2.0/15

Angioplastia:

- Se implanta stent Orsiro 2.25/18 en TPL
- y stent Orsiro 2.5/15 en CD distal solapado al previo



Angioplastia coronaria

- Se recruza guía a IVP y se realiza angioplastia simple con balón liberador de drogas (Pantera Lux de 2.0/15)



Resultado

- Se finaliza el procedimiento con flujo TIMI 3 en ambas ramas de la CD

